



**INDUSTRIAS
FARMACÉUTICAS**
V E T E R I N A R I A S

2025
VADEMECCUM



**LOS MEJORES PRODUCTOS
PARA EL CUIDADO
ANIMAL**

www.laboratoriosgt.com



Misión

En G&T, nuestra misión es impulsar la salud y el bienestar animal mediante la excelencia en la producción y distribución de productos veterinarios. Nos comprometemos a proporcionar soluciones innovadoras y de alta calidad que contribuyan al desarrollo sostenible de la industria pecuaria, avícola y de animales de compañía. Guiados por la ética y el compromiso, buscamos fortalecer la relación de confianza con nuestros clientes y socios, garantizando la salud y bienestar animal en cada paso.

Nuestra visión en G&T, es ser reconocidos como líderes en el sector de productos veterinarios, destacándonos por nuestra calidad, innovación y compromiso con la salud animal. Aspiramos a expandir nuestra presencia en América Latina, siendo referentes en el desarrollo y aplicación de tecnologías avanzadas para el cuidado de los animales. A través de la colaboración constante y mejora continua, buscamos ser la opción preferida de nuestros clientes y contribuir significativamente al progreso y sostenibilidad de la industria veterinaria.



Visión



ANTIBIOTICOS





**INDUSTRIAS
FARMACÉUTICAS**
V E T E R I N A R I A S

ANTIBACTERIANO

Solución Inyectable **BRONCODOX FORTE**

Fórmula:

Doxiciclina hclato 10.0 g, Tilosina tartrato 10.0 g,
Bromhexina 0.5 g, Excipientes c.s.p. 100 mL

Indicaciones:

BRONCODOX FORTE es una combinación antibiótica de amplio espectro que tiene como principios activos a la tilosina tartrato y a la doxiciclina. Ambos componentes son de acción bacteriostática que generan un efecto rápido y prolongado contra las bacterias Gram positivas, Gram negativas y algunos protozoos. Además está asociado con bromhexina un expectorante que ayuda a despejar las vías respiratorias.

BRONCODOX FORTE se indica para el tratamiento de ERC, neumonías, bronquitis, traqueo bronquitis y otras afecciones broncopulmonares de tipo infecciosas.

Especie destino:

Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, porcinos, aves.

Dosificación:

Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, porcinos: 1 mL/10 kg de peso vivo.
Aves: 0.1 mL/kg de peso vivo.

Vía de Administración:

Vía Intramuscular.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Frasco	20	mL
Frasco	50	mL
Frasco	100	mL
Frasco	250	mL
Frasco	500	mL



www.laboratoriosgyt.com



+51- 972 050 995
ventas@laboratoriosgyt.com

Mz. G Lt. 1 Asoc, Hijos
de Apurimac - Etapa
Primera - Ate - Lima





Tableta Oral

CLAMOCOR

Fórmula:

Amoxicilina Trihidrato 200.0 mg, Ácido Clavulánico 50.0 mg, Silimarina 200.0 mg, Excipientes c.s.p. 1 tableta 800.0 mg.

Indicaciones:


Indicado para el tratamiento adyuvante de infecciones respiratorias, gastrointestinales o dérmicas (incluidas heridas y abscesos) causadas por bacterias sensibles a la amoxicilina en combinación con ácido clavulánico, como *Pasteurella* sp., *Streptococcus* sp., y *Escherichia coli*. La Silimarina es una antioxidante hepatoprotector, regulador de la respuesta antiinflamatoria en procesos gastrointestinales.

Especie destino:

Caprinos y felinos.

Dosis y Vía de Administración:

Vía Oral. Perros: 1 tableta por cada 20 kg de peso vivo cada 12 horas. En caso de infecciones severas, la dosis puede ser duplicada hasta 1 tableta por cada 10 kg peso cada 12 horas.

**Presentaciones**

Envase	Contiene	Medida
Caja	20	Tableta
Caja	32	Tableta



Mz. G Lt. 1 Asoc, Hijos
de Apurimac - Etapa
Primera - Ate - Lima



+51- 972 050 995
ventas@laboratoriosgyt.com

www.laboratoriosgyt.com





**INDUSTRIAS
FARMACÉUTICAS**
V E T E R I N A R I A S

ANTIBACTERIANO

Solución Inyectable **CICLOFORTE** **13.5%**

Fórmula:

Oxitetraciclina HCL equivalente a Oxitetraciclina Base 12%. Diclofenaco Sódico 0.5%, Vehículo c.s.p. 100 mL.

Indicaciones:

Antibiótico de amplio espectro y de larga acción con poder analgésico y antirreumático por su combinación de Oxitetraciclina con Diclofenaco, recomendado para el tratamiento de las enfermedades: neumonías, ántrax, mastitis septicémica, metritis, infecciones genitourinarias, carbunco sintomático, pasteurolosis, bronquitis, leptospirosis, artritis de diversos orígenes, enterotoxemia y anaplasmosis, entre otros.

Especie destino:

Bovinos, ovinos, camélidos sudamericanos, equinos, porcinos.

Dosis y Vía de Administración:

Intramuscular, subcutánea, intravenosa. 1 mL x 10 Kg de peso equivalente a 12 mg de Oxitetraciclina y 0.5 mg de diclofenaco por cada Kg de peso vivo.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Frasco	20	mL
Frasco	50	mL
Frasco	100	mL
Frasco	250	mL
Frasco	500	mL



www.laboratoriosgyt.com



+51- 972 050 995
ventas@laboratoriosgyt.com

Mz. G Lt. 1 Asoc, Hijos
de Apurimac - Etapa
Primera - Ate - Lima





SUSPENSIÓN INTRAMAMARIA

CEFAGYT

Fórmula:

Cada 10 ml contiene:

Cefalexina (como monohidrato)	200 mg
Gentamicina (como sulfato)	100 mg
Dexametasona fosfato sódico	0.75 mg
Vitamina A (como palmitato)	10 000 UI
Excipientes c.s.p.	10 mL

Indicaciones de uso:

Para el tratamiento de mastitis clínicas en vacas lecheras en lactación ocasionadas por *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis*, y *Escherichia coli*. La acción de la dexametasona facilita el paso de los antibióticos a través de la barrera inflamatoria. La vitamina A actúa como coadyuvante para reforzar el sistema inmune de la vaca.

Especie destino:

Bovinos.

Dosis: Bovinos (vacas en lactación), tratar el/los cuarto (s) infectado (s) durante 2 días o hasta la recuperación completa, con un intervalo de 12 a 24 horas entre tratamiento. Utilizar el contenido de una jeringa (10 ml) por cuarto. Cada jeringa es de un solo uso.


Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Jeringa	10	mL



Mz. G Lt. 1 Asoc, Hijos
de Apurimac - Etapa
Primera - Ate - Lima



+51- 972 050 995
ventas@laboratoriosgyt.com

www.laboratoriosgyt.com




**INDUSTRIAS
FARMACÉUTICAS**
V E T E R I N A R I A S

ANTIBACTERIANO

Solución Inyectable **DOXIFENO LA**

Fórmula:

Doxiciclina 20 g. Ketoprofeno 3 g., Excipientes c.s.p.
100 mL.

Indicaciones: Esta indicado en todos los procesos infecciosos con reacción inflamatoria, dolorosa y febril, infección sistémica y locales, bronconeumonía, mastitis, enteritis bacteriana, artritis, osteoartritis, infecciones del tracto urinario, prostatitis, pododermatitis, queratoconjuntivitis, clamidiosis, anaplasmosis, carbunco, rinitis atrófica, leptospirosis, actinomicosis, actinobacilosis, nocardiosis, eperythrozoonosis, haemobartenolosis, etc.

Especie destino:

Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, porcinos, aves.

Dosis:

En todas las especies: 1 mL/10 kg de peso vivo.
Repetir tratamiento, luego de 72 horas de ser necesario.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Frasco	20	mL
Frasco	50	mL
Frasco	100	mL
Frasco	250	mL
Frasco	500	mL



www.laboratoriosgyt.com



+51- 972 050 995
ventas@laboratoriosgyt.com

Mz. G Lt. 1 Asoc, Hijos
de Apurimac - Etapa
Primera - Ate - Lima





Solución Inyectable

OXIDEXA 10%

Fórmula:

Oxitetraciclina HCL 10.0 g. Dexametasona sodio fosfato 0.5 g., Excipientes c.s.p. 100.0 mL.

Indicaciones:

Esta formulada a base de Oxitetraciclina, antibiótico de amplio espectro (en un vehiculo de acción prolongada), asociada a Dexametasona, un antiinflamatorio corticosteroide indicado para la prevención y tratamiento de todos los procesos infecciosos con reacción inflamatoria, dolorosa y febril, tanto en infecciones sistémicas como locales, bronconeumonias, mastitis, enteritis, artritis, osteoartritis, infecciones del tracto urinario, prostatitis, pododermatitis, queratoconjuntivitis, infecciones inespecíficas y bacterianas secundarias a enfermedades víricas.

Especie destino:

Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, porcinos, caninos, felinos, conejos, cuyes y aves.


Dosis y Vía de Administración:

Bovinos, Equinos, Ovinos, Caprinos, Camélidos Sudamericanos y Porcinos: 1 mL por cada 10 kg de peso vivo/día, durante 3 a 5 días. IM o EV.

Caninos y Felinos: 1 mL por cada 5 kg. de peso vivo por día, durante 3 a 5 días. IM o EV.

Conejos y Cuyes: 0.2 mL por cada 1 Kg. de peso vivo por día, durante 3 a 5 días.

IM o SC Aves: 0.5 mL por cada 1 Kg. de peso vivo por día, durante 3 a 5 días. IM vía intramuscular; endovenosa subcutánea, intraperitoneal e infiltración local.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Frasco	20	mL
Frasco	50	mL
Frasco	100	mL
Frasco	250	mL
Frasco	500	mL





**INDUSTRIAS
FARMACÉUTICAS**
V E T E R I N A R I A S

ANTIBACTERIANO

Solución Inyectable **SULFPRIM**

Fórmula:

Sulfadoxina 20 g., Trimetoprim 4 g., Excipientes c.s.p.
100 mL.

Indicaciones:

Esta indicado para el tratamiento de enfermedades causadas por bacterias sensibles a la combinación Sulfatrimetoprim, en el caso de infecciones de vías urinarias, infecciones de órganos genitales de hembras y machos, infecciones gastrointestinales, disentería bacteriana, heridas y otras infecciones producidas por bacterias sensibles.

Especie destino:

Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, porcinos, caninos, felinos, conejos, cuyes y aves.

Dosis y Vía de Administración:

Vía intramuscular e intravenosa.

1 mL/15 Kg p.v.

Dosis práctica:

3 mL/50 Kg. p.v.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Frasco	20	mL
Frasco	50	mL
Frasco	100	mL
Frasco	250	mL
Frasco	500	mL



www.laboratoriosgyt.com



+51- 972 050 995
ventas@laboratoriosgyt.com

Mz. G Lt. 1 Asoc, Hijos
de Apurimac - Etapa
Primera - Ate - Lima





Solución Inyectable **TILOVET**

Fórmula:

Tilosina 50.0 mg. Enrofloxacin 25.0 mg.,
Excipientes c.s.p.1.0 mL.

Indicaciones:

Es una asociación sinérgica aditiva de dos potentes antibióticos bacteriostáticos, de amplio espectro de acción a base de tilosina y enrofloxacin. Esta indicado para el tratamiento de infecciones respiratorias, gastrointestinales, urinarias y dérmicas.

Especie destino:

Porcinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos.

Dosis y Vía de Administración:

Ovinos: (1 mL/5 Kg p.v.s)

Porcinos, Ovinos, Caprinos y Camélidos sudamericanos: (1 mL/5 Kg. p.v.s.).



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Frasco	20	mL
Frasco	50	mL
Frasco	100	mL
Frasco	250	mL
Frasco	500	mL



Solución Inyectable **EMIVET/LA**

Fórmula:

Cada 100 mL contiene: Oxitetraciclina base 20.0 g.,
Excipientes c.s.p. 100.0 mL.

Indicaciones:

Antibiótico de larga acción, eficaz contra patógenos bacterianos gram (+) y (-). Indicado para el tratamiento y control de un amplio rango de enfermedades sistémicas, respiratorias, gastrointestinales y urinarias asociadas con organismos sensibles a la Oxitetraciclina.

Especie destino:

Lechones, porcinos.

Dosis y Vía de Administración:

Intramuscular profunda, subcutánea o endovenosa.

Lechones: Subcutánea aplicar 1 mL por cada 10 kg de peso vivo.

Cuando la dosis sea superior a 20 mL en bovinos o 10 mL en porcinos, distribuir la dosis en dos sitios diferentes.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Frasco	20	mL
Frasco	50	mL
Frasco	100	mL
Frasco	250	mL
Frasco	500	mL





Solución Oral

ENRROX B12

Fórmula:

Enrofloxacin 20.5 g., Vitamina B12 3 mg.
Excipientes c.s.p. 100 mL.

Indicaciones:

Es una solución de uso oral altamente concentrada indicado para el control de infecciones del sistema respiratorio, gastrointestinal, genitourinario y piel. Su asociación con vitamina B12 favorece la pronta recuperación del animal.

Especie destino:

Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, porcinos, conejos, cuyes y aves.


Dosis y Vía de Administración:

Administración diaria.

Conejos y Cuyes: 14 días.

Camélidos: dosis única. Porcinos, caprinos, ovinos, Bovinos: 3-5 días.

Aves (pollos de carne y pavos): 3-5 días. En el caso de Salmonelosis (pollos de carne y pavos): aplicar el tratamiento por 5 días. En el caso de Salmonelosis, aplicar el tratamiento hasta 5 días.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Frasco	20	mL
Frasco	120	mL
Frasco	250	mL
Frasco	500	mL
Frasco	1	Lt





**INDUSTRIAS
FARMACÉUTICAS**
V E T E R I N A R I A S

ANTIBACTERIANO

Solución Oral **ENROBROM**

Fórmula:

Cada 100mL del producto contiene:

Enrofloxacin20.0 g.
Bromhexina..... 1.5 g.
Excipientes c.s.p. 100 ml

Indicaciones:

ENROBROM, está indicado para el tratamiento y prevención de procesos respiratorios y gastrointestinales. Es ideal para controlar infecciones causadas por gérmenes gram-positivos, gram-negativos y Micoplasma, asociadas con el incremento en la producción de moco.

Especies de destino: Porcinos y Aves

Dosis y Vía de Administración:

Aves: 1 mL /20 Kg peso vivo.

Cerdos: 1 mL /40 Kg peso vivo.

Intervalo y duración del tratamiento.

Administración diaria.

Porcinos y aves: 3 – 5 días.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Frasco	30	mL
Frasco	120	mL
Frasco	250	mL
Frasco	500	mL
Frasco	1	Lt



www.laboratoriosgyt.com



+51- 972 050 995
ventas@laboratoriosgyt.com

Mz. G Lt. 1 Asoc, Hijos
de Apurimac - Etapa
Primera - Ate – Lima





Polvo Soluble **DOXICOR** **ML & L**

Fórmula:

Doxiciclina Hiclato 50 g,
Excipientes c.s.p. 100 g.

Indicaciones: En Aves: Está indicado para tratamientos de Cólera aviar, Estreptococosis, Estafilococosis, Colibacilosis, Salmonelosis, Coriza infecciosa, Mycoplasmosis, Clostridiasis y Clamidiasis.

En Porcinos: Neumonía enzoótica, Pleuroneumonía, Pasteurellosis, Rinitis, Enfermedad de Glasser, Enteritis Proliferativa, Leptospirosis, M.M.A. (mastitis, metritis, agalactea), Cistitis, Pielonefritis, Colibacilosis y en las complicaciones de enfermedades virales.

Especie destino: Aves y porcinos.

Dosis/ Vía de administración:


Oral mezclado con alimento.

Para Aves:

Primera semana	100g/tonelada de ración
Segunda semana	120g/tonelada de ración
Tercera semana	160g/tonelada de ración
Cuarta semana	190g/tonelada de ración
A partir de la cuarta semana	240g/tonelada de ración

Para Porcinos:

Inicial	420g/tonelada de ración
Crecimiento	550g/tonelada de ración
Acabado	630g/tonelada de ración



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Sobres	100	gr
Sobres	500	gr
Bolsa	1	kg
Bolsa	5	kg
Bolsa	10	kg
Bolsa	25	kg



Mz. G Lt. 1 Asoc, Hijos
de Apurimac - Etapa
Primera - Ate - Lima



+51- 972 050 995
ventas@laboratoriosgt.com

www.laboratoriosgt.com





**INDUSTRIAS
FARMACÉUTICAS**
V E T E R I N A R I A S

ANTIBACTERIANO

Polvo Soluble **PLUMAS**

Fórmula:

Oxitetraciclina clorhidrato 7.0 g., Tilosina tartrato 6.0 g., Vitamina C 3.0 g, Vitamina B1 1.0 g., Vitamina B12 1.0 mg., Excipientes c.s.p. 100.0 g.

Indicaciones:

Esta indicado en el tratamiento contra Gram positivos y Gram negativos, causante de las enfermedades de las aves, por consiguiente, está indicado para la prevención y el tratamiento curativo de los procesos respiratorios y entéricos en las aves.

Especie destino: Pollos y pavos.

Dosis y Vía de Administración:

Vía Oral, disuelto en agua de bebida.

Pollos y pavos: 840 mg PLUMAS/Kg de peso vivo/día; en el agua de bebida.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Sobres	10	gr
Sobres	100	gr



www.laboratoriosgyt.com



+51- 972 050 995
ventas@laboratoriosgyt.com

Mz. G Lt. 1 Asoc, Hijos
de Apurimac - Etapa
Primera - Ate - Lima





Polvo Soluble

POLLITO AMARILLO

Fórmula:

Tilosina tartrato 7.5 g., Fosfomicina 20.0 g., Dexametasona 0.02 g., Excipientes c.s.p. 100.0 g.

Indicaciones:

Los antibióticos componentes están indicados contra Gram positivos y Gram negativos, causantes de los procesos respiratorios y entéricos que atacan a las aves, siendo los más comunes: Infecciones por micoplasmas, colisepticemia, coriza contagiosa aviar, pasteurelisis, salmonelosis, infecciones por estafilococos, erisipela, infecciones mixtas con bacterias y micoplasmas, infecciones secundarias a enfermedades virales.

Especie destino: Aves.

Dosis y Vía de Administración:

Vía Oral, disuelto en agua de bebida.

Aves: 1g/7.5 kg de peso vivo; en el agua de bebida.

Duración del tratamiento: De 3 a 5 días.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Sobres	100	gr
Sobres	500	gr
Bolsa	1	kg
Bolsa	5	kg
Bolsa	10	kg
Bolsa	25	kg



Mz. G Lt. 1 Asoc, Hijos
de Apurimac - Etapa
Primera - Ate - Lima



+51- 972 050 995
ventas@laboratoriosgt.com

www.laboratoriosgt.com





**INDUSTRIAS
FARMACÉUTICAS**
V E T E R I N A R I A S

ANTIBACTERIANO

Polvo Soluble **BRONCODOX POLVO**

Fórmula: Doxiciclina hclato 10.0 g., Tilosina 10.0 g., Bromhexina 1.0 g., Silimarina 1.0 g., Vitamina B1 2.0 g., Vitamina B12 3.0 mg., Vitamina C 3.0 g., Excipientes c.s.p. 100.0 g.

Indicaciones: esta indicado para el tratamiento y prevención de infecciones causadas por gérmenes sensibles a la tilosina y/o doxiciclina, además por la acción de la bromhexina reduce la viscosidad del moco en las vías respiratorias lo que permite una mejor acción de los antibióticos a nivel de las vías respiratorias. La silimarina junto con las vitaminas B1, B12 y C. cumple la función protectora contra el estrés oxidativo celular producido por el proceso infeccioso ayudando a una rápida recuperación de diversas infecciones del aparato respiratorio, digestivo y urogenital tales como: micoplasmosis, ERC, coriza, colibacilosis, onfalitis e infección del saco vitelino, cólera aviar, enteritis y diarrea, enteritis necrótica, saculitis, sinusitis, sinovitis, estafilococosis, estreptococosis, corinebacteriosis, hexamitiasis leptospirosis entre otras. Prevención de infecciones bacterianas secundarias consecutivas a infecciones virales, condiciones de estrés, vacunaciones, realojamiento, corte de pico, transporte, cambios de alimentación y clima. Agente etiológicos susceptibles: Pasteurella multocida. Bordetella bronchiseptica, Streptococcus spp., Arcanobacterium pyogenes, Histophilus somni, Mycoplasma spp., Actinobacillus pleuropneumoniae, E. coli, Haemophilus paragallinarum, Bordetella avium, Clostridium perfringens y clostridium colinum.

Especie destino: Porcinos y Aves.

Dosis y Vía de Administración: 1 g. por cada 10 kg. de peso vivo. Vía oral, mezclado con el alimento, en el agua de bebida, o sustituto lácteo dependiendo a la especie y de acuerdo a la dosificación por animal.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Sobres	100	gr
Sobres	500	gr
Bolsa	1	kg
Bolsa	5	kg
Bolsa	10	kg
Bolsa	25	kg



www.laboratoriosgyt.com



+51- 972 050 995
ventas@laboratoriosgyt.com

Mz. G Lt. 1 Asoc. Hijos
de Apurimac - Etapa
Primera - Ate - Lima





Polvo Soluble **K SULF**

Fórmula:

Sulfaquinoxalina 10.0 g., Vitamina k3 0.22 g.,
Excipientes c.s.p. 100.00 g.

Indicaciones:

K SULF, por sus principios activos sulfaquinoxalina y vitamina k, está indicado para el tratamiento de cuadros infecciosos producidos por coccidios en aves bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, conejos y cuyes, combatiendo a los agentes infecciosos y atenuando paulatinamente al principal síntoma que es la hemorragia.

Especie destino:

Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, porcinos, conejos, cuyes y aves.

Dosis y Vía de Administración:

Aves, bovinos y porcinos: en el agua de bebida o mezclado con el alimento.

Ovinos, conejos y cuyes: en el agua de bebida.
Caprinos: en el alimento.

Bovinos y porcinos: 1g del producto/4 kg de p.v.
Ovinos: 15 g del producto/10 L. de agua de bebida.
Caprinos: 550 g. del producto/ Tonelada de alimento.

Aves: 1.5 g - 2.5 g del producto/kg. de alimento ó 1.5 g - 2.5 del producto/ L. de agua de bebida.

Cuyes: 45 g. del producto/5 L de agua de bebida.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Sobres	10	gr
Sobres	100	gr
Sobres	1	kg



Mz. G Lt. 1 Asoc, Hijos
de Apurimac - Etapa
Primera - Ate - Lima



+51- 972 050 995
ventas@laboratoriosgt.com

www.laboratoriosgt.com





**INDUSTRIAS
FARMACÉUTICAS**
V E T E R I N A R I A S

ANTIBACTERIANO

Solución Oral **BRONCODOX** SOLUCIÓN B12

Fórmula:

Doxiciclina hclato 11.5 g., Tilosina tartrato 10.0 g.,
Bromhexina 1.0 g., Acido acetil salicilico 20.0 g.,
Vitamina B12 3.0 mg., Excipientes c.s.p. 100 mL.

Indicaciones:

Tratamiento de infecciones respiratorias y
gastrointestinales producidas por bacterias Gram
Positivas, Gram Negativas y Micoplasmas sensibles a
la doxiciclina y tilosina como Mycoplasma sp, E. coli,
Salmonella, Pasteurella, Bordetella, Streptococcus,
Campylobacter, Clostridium sp.

Especies de destino:

Bovinos, porcinos y aves.

Dosis y Vía de Administración:

Aves: 2 gotas x kg de peso

Cerdos: 1 mL x 10 Kg de peso.

Oral en el agua de bebida.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Frasco	30	mL
Frasco	60	mL
Frasco	120	mL
Frasco	250	mL
Frasco	500	mL
Frasco	1	Lt
Frasco	3.5	Lt



www.laboratoriosgyt.com



+51- 972 050 995
ventas@laboratoriosgyt.com

Mz. G Lt. 1 Asoc, Hijos
de Apurimac - Etapa
Primera - Ate - Lima





Suspensión Inyectable

PENSIVET FORTE

Fórmula:

Bencilpenicilina G. Procaínica 20,000,000.0 UI,
Sulfato de Dihidroestreptomicina 25.0 g.,
Excipientes c.s.p. 100 mL.

Indicaciones:

PENSIVET FORTE es una combinación antibiótica sinérgica, indicada para el tratamiento de infecciones producidas por microorganismos sensibles a la penicilina G procaínica (Bencilpenicilina) y a la dihidroestreptomicina, tales como enfermedades del tracto respiratorio (neumonía y rinitis atrófica), gastrointestinales y urogenitales; metritis, meningitis, septicemia, cistitis, infecciones articulares e infecciones bacterianas secundarias.

Especie destino:

Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, porcinos.

Dosis y Vía de administración:

Bovinos, ovinos, caprinos, equinos, porcinos y camélidos sudamericanos: 1mL/25 Kg Peso vivo.
Intramuscular profunda, subcutánea.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Frasco	20	mL
Frasco	50	mL
Frasco	100	mL
Frasco	250	mL
Frasco	500	mL





**INDUSTRIAS
FARMACÉUTICAS**
V E T E R I N A R I A S

ANTIBACTERIANO

Polvo Soluble **SUPER KIKIRIKI**

Fórmula:

Cada 100 g contiene: Fosfomicina sódica 4.5 g, Florfenicol 9.0 g, Bromhexina 0.25 g, Vitamina B3 0.50 g, Vitamina B6 150.0 g, Vitamina B12 1 mg, Excipientes c.s.p. 100g.

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por gérmenes gram-positivos y gram-negativos sensibles a la fosfomicina y florfenicol, asociado con Bromhexina que mejora la penetración de los antimicrobianos al tejido respiratorio. Además, contiene vitaminas del complejo B para favorecer la recuperación del animal.

Especie destino:

Aves.

Dosis y Vía de Administración:

Vía Oral. Dosis del producto: 225 mg/kg de peso vivo, cada 24 horas. Dosis practica: 5g/4 litros en agua de bebida o 5g/2 Kg de alimento.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Sobres	10	gr
Sobres	100	gr



www.laboratoriosgyt.com



+51 - 972 050 995
ventas@laboratoriosgyt.com

Mz. G Lt. 1 Asoc, Hijos
de Apurimac - Etapa
Primera - Ate - Lima





Solución Oto - oftálmica

OPTHOVET PREMIUM

Fórmula:

Cada 1 mL contiene:

Gentamicina Base (como sulfato) 3.0 mg

Dexametasona fosfato-sodio 1.0 mg

Lidocaina Clorhidrato 5.0 mg

Excipientes c.s.p. 1.0 mL

Indicaciones:

Para el tratamiento de afecciones de ojos y oídos como blefaritis (inflamación de los párpados), conjuntivitis, queratitis (inflamación de la córnea) y otitis externa y media causados por bacterias sensibles a la gentamicina. Es activo frente a bacterias Gram (-) y Gram (+), en particular sobre *Pseudomonas* y *Staphylococcus*.

Especie destino:

Bovinos, caninos, felinos.

Dosis:

Instilar 1-2 gotas en el saco conjuntival del ojo afectado, 2-3 veces al día.

En caso de Otitis: Administrar en el oído, 4 ó 5 gotas, 2-3 veces al día, previa limpieza del conducto auditivo externo afectado.

La duración y frecuencia del tratamiento dependerán del resultado clínico y del criterio del Médico Veterinario, pero se deberá tener en cuenta no suspender hasta obtener resolución.

**Presentaciones**

Envase	Contiene	Medida
Frasco	10	mL
Frasco	20	mL



Mz. G Lt. 1 Asoc, Hijos
de Apurimac - Etapa
Primera - Ate - Lima



+51- 972 050 995
ventas@laboratoriosgt.com

www.laboratoriosgt.com





**INDUSTRIAS
FARMACÉUTICAS**
V E T E R I N A R I A S

ANTIBACTERIANO

Suspensión Inyectable **DEXAGOLD**

FÓRMULA:

Dexametasona (como fosfato sódico) 2 mg
Excipientes c.s.p 1 mL

INDICACIONES: Procesos inflamatorios de sistema locomotor, artritis, bursitis, tendinitis, reacciones alérgicas, shock, cetosis bovina.

ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, ovinos, camélidos, equinos, porcinos, caninos, felinos y aves.

DOSIS:

Bovinos y equinos:

5-15 mL (aprox. 0.02 mL/kg de pv).

Potros, terneros, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos y cerdos:

1-3 mL (aprox. 0.025 mL/kg de pv).

Caninos:

0.1 - 1 mL (aprox. 0.055 mL/kg de pv).

Felinos:

0.1 - 0.3 mL (aprox. 0.075 mL/kg de pv).

Aves:

0.05-0.1 mL (aprox. 0.15 mL/kg de pv).

Intraarticular: 1-5 mL

Cuadro de cetosis: 3-20 mL por animal.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular, intravenoso, subcutáneo, intraarticular.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Frasco	20	mL
Frasco	50	mL
Frasco	100	mL
Frasco	250	mL
Frasco	500	mL



www.laboratoriosgyt.com



+51- 972 050 995
ventas@laboratoriosgyt.com

Mz. G Lt. 1 Asoc, Hijos
de Apurimac - Etapa
Primera - Ate - Lima





INTRAUTERINO **TETRALAB NF**

Fórmula:

Cada óvulo contiene:

Oxitetraciclina

500 mg

Excipientes c.s.p.

1 óvulo

Indicaciones de uso:

Tratamiento de infección uterina puerperal (endometritis). Como adyuvante en el tratamiento de metritis.

Tiene acción contra Bacterias Gram positivas y Gram negativas.

Especies de destino:

Bovinos, equinos, ovinos y porcinos.

Vía de Administración:

vía intrauterina

**Presentaciones**

Envase	Contiene	Medida
Caja	12	Tableta
Caja	32	Tableta



ANTIPARASITARIOS INTERNOS





Solución Oral

CLOSALVET PLUS 12%

Fórmula:

Closantel sódico 12.0 g., Selenito de sodio 50.0 mg.,
Excipientes c.s.p. 100.0 mL

Indicaciones:

Esta indicado en bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos para el control de Fasciola hepática o dístoma (estadios juveniles y maduros) y nemátodos gastrointestinales hematófagos. Su rango de acción elimina también Fasciola gigántica, ectoparásitos como Oestrus ovis, ácaros causantes de la sarna, dermatobia, garrapatas, entre otros. La acción del selenio reduce el periodo de recuperación de los animales debilitados por los parásitos, (esencial para el mantenimiento de las funciones orgánicas), previene anemias, mejora el nivel reproductivo y estimula el apetito.

Especie destino:

Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos.

Dosis y Vía de administración:

Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos: 1mL/12 kg de peso vivo, por vía oral.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Frasco	30	mL
Frasco	60	mL
Frasco	120	mL
Frasco	250	mL
Frasco	500	mL
Frasco	1	Lt



Mz. G Lt. 1 Asoc, Hijos
de Apurimac - Etapa
Primera - Ate - Lima



+51- 972 050 995
ventas@laboratoriosgyt.com

www.laboratoriosgyt.com





**INDUSTRIAS
FARMACÉUTICAS**
V E T E R I N A R I A S

ANTIPARASITARIOS
INTERNOS

Suspensión Oral **FASIGOL PREMIUM 22.2%**

Fórmula:

Triclabendazol 12.0 g., Fenbendazol 10.0 g.,
Ivermectina 0.2 g., Excipientes c.s.p. 100 mL.

Indicaciones:

Antiparasitario interno y Externo. Para el control y tratamiento de parásitos internos como la Fasciola hepática (estadio inmaduro temprano, inmaduro y adulto), nemátodos gastrointestinales, pulmonares y tenias, así como para el control de ectoparásitos en ganado bovino, ovino, caprino y camélidos sudamericanos.

Especie destino:

Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos.

Dosis y Vía de administración:

1 mL por 10 kpv en bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: (Triclabendazol 12 mg/kpv, Fenbendazol 10 mg/kpv e Ivermectina 0.2 mg/kpv). Vía oral.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Frasco	30	mL
Sachet	40	mL
Frasco	120	mL
Frasco	250	mL
Frasco	500	mL
Frasco	1	Lt
Frasco	3.5	Lt



www.laboratoriosgyt.com



+51- 972 050 995
ventas@laboratoriosgyt.com

Mz. G Lt. 1 Asoc, Hijos
de Apurimac - Etapa
Primera - Ate - Lima





Solución Oral

FINPAR GEL

Fórmula:

Praziquantel 25.0 mg, Pamoato de pirantel 72.058 mg (equivalente a 25 mg de pirantel), Febantel 75.0 mg., Excipientes c.s.p. 1.00 mL

Indicaciones:

Indicado para el control simultáneo de infestaciones causadas por parásitos del tipo nemátodo y tenias como *Toxocara canis*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma sp.*, *Trichuris vulpis*, *Echinococcus sp.*, *Taenia sp.* y *Dipylidium caninum* (adultos y estadios inmaduros).

Especie destino:

Caninos y felinos.

Dosis y Vía de administración:

Administrar vía oral a razón de: 1 mL por cada 5 kg. de peso vivo para caninos y felinos. Única dosis. Si hay una evidente alta infestación, se recomienda repetir dentro de 15 días.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Jeringa	2	mL
Jeringa	5	mL
Frasco	60	mL



Mz. G Lt. 1 Asoc, Hijos
de Apurimac - Etapa
Primera - Ate - Lima



+51- 972 050 995
ventas@laboratoriosgyt.com

www.laboratoriosgyt.com





**INDUSTRIAS
FARMACÉUTICAS**
V E T E R I N A R I A S

ANTIPARASITARIOS
INTERNOS

Suspensión Oral **PODER RA**

Fórmula:

Rafoxanide 10.0 g, Albendazole 10.0 g, Sulfato de Cobalto 6.0 g, Metionina 0.7 g, Lisina 0.47 g, Sulfato de Zinc 3.0 g, Selenio de Sodio 3.0 g, Excipientes c.s.p. 100.0 mL.

Indicaciones:

Es un antiparasitario que elimina Fasciola hepática en sus estadios juveniles y adultos. También controla infestaciones producidas por nematodos gastrointestinales y pulmonares, cestodos y larvas del gusano de la nariz. La asociación con cobalto y aminoácidos estimula, en el animal parasitado, la síntesis de vitamina B12, esencial para el mantenimiento de las funciones orgánicas, previene anemias, mejora el nivel reproductivo. Tiene efecto energizante y estimula el apetito.

Especie destino:

Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos.

Dosis y Vía de administración:

Bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: 1 mL/10 Kg. peso vivo. Intervalo entre dosis y duración del tratamiento: 8 - 10 semanas en temporada de infestación; 5 - 6 semanas en casos agudos y subagudos.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Frasco	30	mL
Sachet	40	mL
Frasco	120	mL
Frasco	250	mL
Frasco	500	mL
Frasco	1	Lt
Frasco	3.5	Lt



www.laboratoriosgyt.com



+51- 972 050 995
ventas@laboratoriosgyt.com

Mz. G Lt. 1 Asoc, Hijos
de Apurimac - Etapa
Primera - Ate - Lima





Suspensión Oral **TF 22%**

Fórmula:

Triclabendazol 12.0 g., Fenbendazol 10.0 g.,
Excipientes c.s.p. 100.0 mL.

Indicaciones:

TF-22% es un antiparasitario de espectro total contra todas las especies de parásitos internos: Fasciola hepática (trematodos), parásitos redondos (nematodos) y tenias (cestodos). Posee una fórmula potente y eficaz que asocia Triclabendazol al 12% y Fenbendazol al 10%, lo que asegura una acción total en el control y tratamiento de los parásitos internos. Incluye un efecto fasciolicida completo por eliminar todos los estadios de la Fasciola hepática desde la 1era semana de edad (inmadura joven, inmadura y adulta). Además es un antihelmíntico que actúa contra las formas inmaduras y maduras de nematodos gastrointestinales, pulmonares y tenias.

Especie destino:

Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos.

Dosis y Vía de administración:

Bovinos: 1 mL/ 10 kg peso vivo; Ovinos: 1mL/ 10 kg peso vivo; Caprinos: 1 mL/ 20 kg peso vivo; Equinos: 1 mL/ 10 kg peso vivo; Camélidos sudamericanos: 1 mL/10 Kg peso vivo. Vía oral.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Frasco	30	mL
Sachet	40	mL
Frasco	120	mL
Frasco	250	mL
Frasco	500	mL
Frasco	1	Lt
Frasco	3.5	Lt



Mz. G Lt. 1 Asoc, Hijos
de Apurimac - Etapa
Primera - Ate - Lima



+51- 972 050 995
ventas@laboratoriosgyt.com

www.laboratoriosgyt.com





**INDUSTRIAS
FARMACÉUTICAS**
V E T E R I N A R I A S

ANTIPARASITARIOS
INTERNOS

Suspensión Oral **TRICLAFEMEC** **22.7%**

Fórmula:

Triclabendazole 12.5 g. Fenbendazole 10.0 g.,
Abamectina 0.2 g., Excipientes c.s.p. 100.0 mL.

Indicaciones:

Indicado para el control simultáneo de infestaciones causadas por formas maduras e inmaduras de vermes gastrointestinales como *Haemonchus* sp., *Ostertagia* sp., *Trichostrongylus* sp., *Nematodirus* sp., *Oesophagostomum* sp., *Chabertia* sp., *Lamanema* *chavez*i, pulmonares como *Dyctyocaulus* sp., así como *Fasciola* hepática y miasis nasal (*Oestrus* *ovis*), entre otros.

Especie destino:

Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, porcinos.

Dosis y Vía de administración:

Administrar vía oral a razón de 1 mL del producto por cada 10 Kg de peso vivo.

La dosificación se repite de acuerdo al programa antiparasitario del sistema de producción e indicaciones del médico veterinario.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Jeringa	30	mL
Sachet	40	mL
Frasco	120	mL
Frasco	250	mL
Frasco	500	mL
Frasco	1	Lt
Frasco	3.5	Lt



www.laboratoriosgyt.com



+51- 972 050 995
ventas@laboratoriosgyt.com

Mz. G Lt. 1 Asoc, Hijos
de Apurimac - Etapa
Primera - Ate - Lima





Solución Inyectable **IVER-NITRO**

Fórmula:

Nitroxinil 34.0 g., Ivermectina 1.0 g., Excipientes c.s.p. 100.0 mL.

Indicaciones:

IVER-NITRO, es un antiparasitario endectocida, faciolicida y contra nematodos gastrointestinales y pulmonares, en bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos. También es eficaz para el tratamiento de miasis bovina, oestrosis ovina, ácaros y piojos.

Especie destino:

Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos.

Dosis y Vía de administración:

Bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: 1.5 ml/50 Kg de pesos vivo. Respetar un volumen máximo por punto de inyección de 10 ml. Prever una separación suficiente entre los puntos de inyección cuando sean necesarios varios lugares de administración.

Vía subcutánea.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Frasco	20	mL
Frasco	50	mL
Frasco	100	mL
Frasco	250	mL
Frasco	500	mL





BRONCODOX

Polvo - Inyectable - Oral



Solución Inyectable **DORAVET**

Fórmula:

Doramectina 2.0 g., Excipientes c.s.p. 100.0 mL.

Indicaciones:

DORAVET es un producto efectivo para el tratamiento, control y prevención por largos períodos de nemátodos gastrointestinales adultos, juveniles y nemátodos pulmonares adultos; para el control de parásitos externos garrapatas, piojos chupadores, ácaros de la sarna sarcóptica y psoróptica. Previene el desarrollo de miasis. Su vehículo le confiere una lenta liberación y larga acción.

Especie destino:

Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, porcinos.

Dosis y Vía de administración:

Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y camélidos sudamericanos: 1mL/25 Kg Peso vivo.

Rumiantes: 0.2mg/Kg p.v (200µg/kg p.v).

Porcinos 03mg/Kg p.v (300µg/kg p.v).

Vía subcutánea e intramuscular.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Frasco	20	mL
Frasco	50	mL
Frasco	100	mL
Frasco	250	mL
Frasco	500	mL





Solución Inyectable **LEVAVET FORTE 15%**

Fórmula:

Levamisol HCL 15.0 g, Agua estéril c.s.p. 100.0 mL.

Indicaciones:

Es un poderoso antihelmíntico de amplio espectro, para el control y tratamiento de formas maduras e inmaduras de Parásitos Pulmonares y Gastrointestinales de Vacunos, Ovinos, Caprinos, Camélidos sudamericanos y Porcinos. Efectivo contra: *Haemonchus* spp; *Ostertagia* spp; *Trichostrongylus* spp; *Cooperia* spp; *Nematodirus* spp; *Bunostomum* spp; *Lamanema chavezii*; *Graphinema aucheniae*; *Strongyloides* spp; *Chabertia ovina*, *Oesophagostomum* spp; *Dictyocaulus* spp; *Metastrongylus* spp; *Ascaris suum* y *Stephanurus dentatus*.

Especie destino:

Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, porcinos.

Dosis y Vía de Administración:

Bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: 1 mL/30 kg p.v. vía subcutánea, dosis única. Porcinos: 1-1.5 mL/30 kg p.v. vía subcutánea, dosis única.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Frasco	20	mL
Frasco	50	mL
Frasco	100	mL
Frasco	250	mL
Frasco	500	mL



Mz. G Lt. 1 Asoc, Hijos
de Apurimac - Etapa
Primera - Ate - Lima



+51- 972 050 995
ventas@laboratoriosgyt.com

www.laboratoriosgyt.com





**INDUSTRIAS
FARMACÉUTICAS**
V E T E R I N A R I A S

**ANTIPARASITARIOS
INTERNOS**

Solución Inyectable **IVER + KLOR**

Fórmula:

Ivermectina 1.0 g., Clorsulon 10.0 g.,
Cianocobalamina 30.0 µg., Excipientes c.s.p. 100.0
mL.

Indicaciones:

Para el tratamiento y control de los estadios
larvarios y adultos de parásitos internos:
nematodos gastrointestinales y pulmonares;
Fasciola hepática (desde 8 semanas) y parásitos
externos (Garrapatas, moscas, miasis, piojos y
ácaros de la sarna). Asociado con vitaminas B12
como coadyuvante del estado nutricional.

Especie destino:

Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos
sudamericanos.

Dosis y Vía de administración:

Bovinos, Ovinos, Caprinos y camélidos
sudamericanos: 1 mL/ 50 Kg de pv, equivale a 200 µg
de Ivermectina y 2 mg de Clorsulon por Kg de peso
vivo. La duración del tratamiento o intervalo entre
dosis depende de las categorías y del riesgo
parasitario y/o según criterio del médico veterinario.
Vía subcutánea.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Frasco	20	mL
Frasco	50	mL
Frasco	100	mL
Frasco	250	mL
Frasco	500	mL



www.laboratoriosgyt.com



+51- 972 050 995
ventas@laboratoriosgyt.com

Mz. G Lt. 1 Asoc, Hijos
de Apurimac - Etapa
Primera - Ate - Lima





Solución Inyectable **TIK TOK LA 4%**

Fórmula:

Ivermectina 4.0 mg., AD3E, Cianocobalamina 2.0 mg, Vehículo c.s.p.100.0 mL.

Indicaciones:

TIKTOK 4% + AD3E + B12 es un antiparasitario indicado para el tratamiento y control de parásitos internos (nemátodos gastrointestinales y pulmonares) tales como *Ostertagia* spp., *Haemonchus* spp., *Cooperia* spp., *Trychostrongylus* spp., entre otros. Así como también parásitos externos tales como ácaros de la sarna, larvas de moscas y garrapatas. Además posee un vehículo especial por el cual se puede aplicar por la vía subcutánea e intramuscular.

Especie destino:

Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, porcinos.

Dosis y Vía de administración:

Subcutánea.

Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos: 4 mL. por cada 50 kg. de P.V.
Porcinos: 1 mL. por cada 33.3 kg. de P.V.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Frasco	20	mL
Frasco	50	mL
Frasco	100	mL
Frasco	250	mL
Frasco	500	mL



Mz. G Lt. 1 Asoc, Hijos
de Apurimac - Etapa
Primera - Ate - Lima



+51- 972 050 995
ventas@laboratoriosgyt.com

www.laboratoriosgyt.com



Solución Inyectable **IVOMAX B12**

Fórmula:

Ivermectina 2.0 g., Vitamina B 12 0.01 g.,
Excipientes c.s.p. 100.0 mL.

Indicaciones:

Es un endectocida avanzado, de amplio espectro, de acción prolongada y está indicado para el tratamiento y control de parasitosis internas (nemátodos gastrointestinales y pulmonares), sarna (y otros ectoparásitos). La vitamina B 12 contenida actúa contra la anemia y deficiencias parasitarias.

Especie destino:


Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, porcinos.

Dosis y Vía de administración:

Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos: 1 mL/100 kg peso vivo

Porcinos: 1 mL/66 kg peso vivo.

Vía Subcutánea.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Frasco	20	mL
Frasco	50	mL
Frasco	100	mL
Frasco	250	mL
Frasco	500	mL





Solución Inyectable **IVER PREMIUM** **1.5%**

Fórmula:

Cada 100 mL contiene: Ivermectina 1.5 g., Vehículo c.s.p. 100.0 mL.

Indicaciones:

Indicado para tratamiento y control de parásitos internos (nemátodos gastrointestinales y pulmonares) tales como *Ostertagia* spp., *Haemonchus* spp., *Cooperia* spp., *Trychostrongylus* spp., entre otros. Así como también parásitos externos tales como ácaros de la sarna, larva de moscas y garrapatas. Además posee un vehículo especial por el cual se puede aplicar por vía subcutánea e intramuscular.

Especie destino:

Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos.

Dosis y Vía de Administración:

Subcutánea o Intramuscular profunda.

Bovinos, Ovinos, Caprinos, Camélidos Sudamericanos: 1 mL x 50 Kg de peso vivo equivalente a 200 µg/kg de peso vivo.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Frasco	20	mL
Frasco	50	mL
Frasco	100	mL
Frasco	250	mL
Frasco	500	mL





**INDUSTRIAS
FARMACÉUTICAS**
V E T E R I N A R I A S

ANTIPARASITARIOS
INTERNOS

Suspensión Oral **GANAZOLE PREMIUM 20%**

Fórmula: Albendazol micronizado 20.0 g., Sulfato de cobalto 0.25 g., Sulfato de Zinc 0.6 g., Selenito de Sodio 0.3 g., Vehículo inerte c.s.p. 100.0 mL.

Indicaciones: Antiparasitario interno, efectivo en el tratamiento de las nematodosis gastrointestinales y pulmonares producidas por nematodos sensibles al albendazol tanto formas adultas como larvas, huevos y trematodos hepáticos. Puede controlar infestaciones simples y mixtas (más de un tipo de parásitos). La asociación con Cobalto facilita grandemente la recuperación del animal en casos de cuadros de anemias por insuficiencia de cobalto. Además, es un catalizador orgánico que interviene en el mantenimiento del equilibrio vitamínico y mineral. El Zinc favorece el crecimiento y engorde del animal. El selenio incrementa la potencia sexual y mejora la calidad del semen en los machos y en las hembras ayuda a evitar la retención de la placenta.


Especie destino: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos.

Dosis y Vía de administración:

1 mL por 40 kpv para nemátodos gastrointestinales, pulmonares y tenias.

1 mL por 26.6 kg para *Ostertagia ostertagi*.

1 mL por 20 kg para *Fasciola hepática* (adulta).



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Jeringa	30	mL
Sachet	40	mL
Frasco	120	mL
Frasco	250	mL
Frasco	500	mL
Frasco	1	Lt
Frasco	3.5	Lt



www.laboratoriosgyt.com



+51- 972 050 995
ventas@laboratoriosgyt.com

Mz. G Lt. 1 Asoc, Hijos
de Apurimac - Etapa
Primera - Ate - Lima





Polvo Soluble **FEBENKUR B12**

Fórmula:

Fenbendazol6.0 g
Vitamina B12 200.0ug
Excipientes c.s.p. 100.0 g

Indicaciones:


Esta indicado para el tratamiento contra nemátodos y tenías del sistema gastrointestinal y pulmonar.

Especie de destino:

Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, equinos, camélidos sudamericanos y aves.

Vía de administración:

Oral, mezclado en el alimento.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Sobres	10	gr
Sobres	100	gr





**INDUSTRIAS
FARMACÉUTICAS**
V E T E R I N A R I A S

ANTIPARASITARIOS
INTERNOS

Suspensión Oral **OXIFEN GOLD**


FORMULA:

Triclabendazol 12g
Oxiclozanida 15 g
Ivermectina 0.20 g
Excipientes c.s.p. 100 mL

INDICACIONES: OXFEN GOLD es un antiparasitario de acción total. Por sus componentes su espectro incluye Fasciola hepática en sus estadios inmaduros precoces, inmaduros y adultos; y gusanos del estómago, intestinales y pulmonares. Por la acción de la ivermectina, su espectro también incluye ectoparásitos; ácaros de la sarna, piojos chupadores, larvas de moscas productoras de miasis, gusanos de la nariz entre otros. Y la oxiclozanida, para el tratamiento de fasciolosis crónica causada por Fasciola hepática y Fasciola gigantica en estadio adulto sensible a oxiclozanida.

ESPECIE DESTINO: Bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos.

DOSIS: Bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: 1 mL por 10 kg de peso vivo.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Jeringa	30	mL
Sachet	40	mL
Frasco	120	mL
Frasco	250	mL
Frasco	500	mL
Frasco	1	Lt
Frasco	3.5	Lt



www.laboratoriosgyt.com



+51- 972 050 995
ventas@laboratoriosgyt.com

Mz. G Lt. 1 Asoc, Hijos
de Apurimac - Etapa
Primera - Ate - Lima



FLURO & CAN

+HEPATOPROTECTOR

FLURALANER
SILIMARINA

**3 MESES
PROTECCIÓN**



Contra: pulgas,
garrapatas y ácaros.



ANTIPARASITARIOS EXTERNOS



Concentrado Emulsionable **CYPERKILL 20%**

Fórmula:

Cipermetrina 20.0 g., Excipientes c.s.p. 100.0 mL.

Indicaciones:

CYPERKILL 20% esta indicado para tratar infestaciones de garrapatas, piojos, pulgas, moscas, ácaros en bovinos, ovinos, caprinos, cerdos, aves, y perros, así como también el uso en instalaciones.

Especie destino:

Bovinos, ovinos, caprinos, cerdos, aves y perros

Dosis y Vía de administración:

Vía Tópica, para instalaciones: Para aplicación de instalaciones: 5 -10 mL/5 Litros de agua a 1 - 2 g. de cipermetrina por litro de agua. Para baños de animales: Para baños: 1 mL/ litro de agua (equivalente a 0.5 g de cipermetrina por litro de agua).

Intervalo entre dosis y duración del tratamiento: Repetir el tratamiento a intervalos de 7 a 14 días, dependerá de las indicaciones del médico veterinario.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Frasco	20	mL
Frasco	30	mL
Frasco	120	mL
Frasco	250	mL
Frasco	500	mL
Frasco	1	Lt





Solución Tópica **FIPROME 5G SPRAY**

Fórmula:

Fipronil 2.5 mg., Piriproxifeno 2.5 mg., Dinotefuran 3.2 mg., Butoxido de piperonilo 3.0 mg., Permetrina 20.0 mg., Excipientes c.s.p. 1.0 mL.

Indicaciones:

Indicado para perros mayores de 7 meses de edad y de más de 2 kg de peso. Para el control y prevención de infestaciones de pulgas, piojos, garrapatas, ácaros. Repelente efectivo persistente que previene las picaduras de mosquitos (flebotomos, culex sp y Aedes aegypti) y moscas de establo.

Especie destino:

Perros y felinos.

Dosis y Vía de administración:

Se aplica por pulverización en toda la superficie del animal con el fin de que el pelo quede totalmente mojado. Se aplica en dirección a contrapelo para que tenga contacto con la piel de la mascota. Aplicar a razón de 3 mL de producto por cada Kg de peso vivo.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Frasco	30	mL
Frasco	60	mL
Frasco	120	mL
Frasco	250	mL
Frasco	500	mL



Solución Pour On **FIPROMECC DUO**

Fórmula:

Fipronil 1.0 g., Abamectina 0.2 g., Excipientes c.s.p.
100.0mL.

Indicaciones:

(Indicado para Bovinos.) Ectoparasiticida y endoparasiticida de efectividad contra garrapatas, piojos, larvas de moscas, moscas, ácaros de la sarna, nematodos gastrointestinales y nematodos pulmonares.

Especie destino:

Bovinos, ovinos, caprinos y aves.

Dosis y Vía de administración:

Topica para aplicación pour on, en el dorso de los animales desde la cruz hasta la base de la cola. Bovinos: 1 mL / 10 kpv. Se recomienda repetir el tratamiento cada 40 días o según el criterio del médico veterinario.

El tratamiento puede variar dependiendo de la severidad de la infestación, las características ambientales o las condiciones de manejo.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Frasco	30	mL
Frasco	120	mL
Frasco	250	mL
Frasco	500	mL
Frasco	1	Lt





Solución Pour On **FIPROME C TRIO**

Fórmula:

Fipronil 1.0 g, Abamectina 0.5 g, Butóxido de Piperonilo 0.5 g, Excipientes c.s.p. 100.0 mL.

Indicaciones:

Indicado para Bovinos, para el control y tratamiento contra parásitos externos como ácaros de la sarna, garrapatas y piojos, como también parásitos internos de las especies de nemátodos gastrointestinales y vermes pulmonares.

Dosis y Vía de administración:

Para unción dorsal continua. Aplicar tópicamente a lo largo del lomo en la línea que va desde la cruz hasta la base de la cola. Aplicar a razón de 1 mL por 10 kg de peso vivo. Para asegurar la administración de una dosis correcta, el peso vivo debe ser determinado de forma más precisa posible. Si los animales van a ser tratados de forma colectiva y no individual, deben agruparse según su peso y ser tratados de acuerdo al mismo, para evitar infra o sobredosificaciones. El producto debe utilizarse con un equipo de dosificación apropiado. El intervalo entre 2 tratamientos debe ser al menos 28 días. Para un mejor control de los ectoparásitos, se recomienda utilizar un plaguicida para tratar las instalaciones en general.

Especie destino:

Bovinos.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Frasco	30	mL
Frasco	120	mL
Frasco	250	mL
Frasco	500	mL
Frasco	1	Lt





**INDUSTRIAS
FARMACÉUTICAS**
V E T E R I N A R I A S

**ANTIPARASITARIOS
EXTERNOS**

Solución Emulsionable **DICLOPLUS**

Fórmula:

Cipermetrina 5.0 g, Diclorvos 7.0 g, Butóxido de piperonilo 1.0 g, Excipientes c.s.p. 100.0 mL.

Indicaciones:

Ectoparasitocida de amplio espectro a base de Cipermetrina, Diclorvos Butóxido de Piperonilo para aplicación pour on, indicado para el control de garrapatas (jóvenes y adultos), piojos, moscas de la paleta y larvas de *Dematobia hominis* (nuche) en elganado ovino y porcino.

Especie destino:


Bovinos, ovinos, porcinos.

Dosis y Vía de administración:

Bovinos: 10 mL por 100 Kg de peso vivo.

Porcinos: 5 mL por 100 Kg de peso vivo.

Derramar a lo largo del lomo desde la cruz hasta la región dorsal.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Frasco	20	mL
Sachet	50	mL
Frasco	100	mL
Frasco	250	mL
Frasco	500	mL
Frasco	1	Lt



www.laboratoriosgyt.com



+51- 972 050 995
ventas@laboratoriosgyt.com

Mz. G Lt. 1 Asoc, Hijos
de Apurimac - Etapa
Primera - Ate - Lima





Solución Tópica

BICHEROL AEROSOL

Fórmula:

Oxitetraciclina 0.60 g, Violeta genciana 0.60 g., DDVP (vapona) 1.60 g., Cipermetrina 0.37 g., Sulfadazina 0.11 g., Butoxido de piperonilo 0.021 g., Aluminio en polvo 4.725 g., Excipientes c.s.p. 100 mL.

Indicaciones:

Prevención y control de miasis, en cualquier tipo de heridas inclusive aquellas ocasionadas por castración, descole, descorne, marcación, actos quirúrgicos, ombligo en recién nacido y otras. Por las características de la formulación, que permite un control importante de parásitos y larvas y una actividad residual prolongada evitando la contaminación.

Especie destino:

Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, porcinos y aves.

Dosis y Vía de administración:

Cubrir la zona afectada aplicando BICHEROL SPRAY a una distancia de 15 a 20 cm de la herida. Reiterar la aplicación toda vez que se crea necesario.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Frasco	60	mL
Frasco	120	mL
Frasco	250	mL
Frasco	400	mL



SUPLEMENTOS NUTRICIONALES



Polvo Oral **COMPLEJO B12 G&T**

Fórmula: Vitamina A 8,000.000.0 UI, Vitamina B1 (Tiamina) 6,500.0 mg, Vitamina B2 (Riboflavina) 9,000.0 mg, Vitamina B3 (Nicotidamina) 20,000.0 mg, Vitamina B6 (Pirodoxina) 8,000.0 mg, Vitamina B7 (Biotina) 2,000.0 mg, Vitamina B12 (Cianocobalamina) 30.0 mg, Vitamina B9 (Ácido Fólico) 1,000.0 mg, Vitamina D 8,000.0 mg, Vitamina K 5,000.0 mg, Vitamina C 10,500.0 mg, Pantetonato Cálcico 10,000.0 mg, DL Metionina 30,000.0 mg, Excipientes c.s.p. 1,000.0 mg.

Indicaciones: Es un suplemento vitaminico-mineral, indicado para animales en crecimiento, hembras gestantes, animales en producción (engorde y postura). Permite una recuperación en animales deficientes en vitaminas y minerales producidos por trastornos digestivos y respiratorios provocados por agentes bacterianos, virales y parasitarios, así como por intoxicaciones alimenticias y medicamentosas. Mejora la pobre conversión alimenticia cuando existe deficiencia de algunos de los componentes vitamínicos, emplume deficiente, permite una mejor producción de huevos, crecimiento y fertilidad. Prevención y tratamiento de cualquier tipo de estrés (por cambio de alimento, ambiente, clima adverso, vacunaciones, manejo, transporte, etc.), hepatitis, hígado graso y retraso en el crecimiento.

Especie destino: Bovinos, cerdos, equinos, ovinos, camélidos, aves conejos y cuyes.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Sobres	10	gr
Sobres	100	gr
Sobres	1	kg
Sobres	25	kg





Polvo Oral **ENERGESICO**

Fórmula:

Vitamina B1 8.0g, Vitamina B2 16.0g, Vitamina B3 (niacina) 10.0g, Vitamina B6 11.6g, Biotina (Vitamina B8) 0.3g, Vitamina B12 0.02g, Vitamina C 5.0g, Vitamina D3 5.0g, Vitamina k3 1.0g, Ácido fólico 2.8g, Pantotenato de calcio 47.0g, Cloruro de sodio 217.0g, Cloruro de potasio 34.0 g, Sulfato de magnesio 7.0 g, Silimarina 40.0g, Excipientes c.s.p. 1000.0 g.

Indicaciones:

El suplemento vitamínico - mineral, hepatoprotector, indicado para animales en crecimiento, cerdas gestantes, animales en producción (engorde, huevo), el emplume adecuado. Permite una buena y rápida recuperación de animales deficientes en vitaminas y minerales producidos por trastornos digestivos, respiratorios provocados por agentes bacterianos, virales, parasitarios. Mejora la conversión alimenticia cuando exista deficiencia de algunos de los componentes vitamínicos, permitiendo una mejor producción de huevos, crecimiento, fertilidad. Previene el retardo de crecimiento, laminitis, estados de estrés ocasionados por transporte de animales y vacunación de animales.

Especie destino:

Aves y porcinos.

Dosis y Vía de administración:

Disolver el producto en el agua de bebida a razón de 100 g por cada 200 litros durante 4 días o según las indicaciones del veterinario.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Sobres	10	gr
Sobres	100	gr
Sobres	1	kg
Sobres	25	kg





**INDUSTRIAS
FARMACÉUTICAS**
V E T E R I N A R I A S

**SUPLEMENTO
NUTRICIONAL**

Solución Inyectable

CALCITRON VIT

Fórmula:

Cloruro de calcio 200.0 mg, Retinol Palmitato (Vit. A) 5000.000.0 UI, Colecalciferol (Vit. D3) 750.000.0 UI, Alfa - Tocoferol (Vit. E) 500.0 UI, Cianocobalamina (Vit. B12) 12.0 mg, Excipientes c.s.p.100.0 mL.

Indicaciones:

Emulsión inyectable, para control de enfermedades carenciales y trastorno de metabolismo.

Especie destino:

Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, porcinos y caninos.

Dosis y Vía de administración:

 Vía Subcutánea.

Bovinos y Equinos: 10-12 mL.,

Ovinos, Caprinos y Camélidos

sudamericanos: 3 - 5 mL.,

Porcinos: 5 mL.,

Caninos: 1 mL.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Frasco	20	mL
Frasco	50	mL
Frasco	100	mL
Frasco	250	mL
Frasco	500	mL



www.laboratoriosgyt.com



+51- 972 050 995
ventas@laboratoriosgyt.com

Mz. G Lt. 1 Asoc, Hijos
de Apurimac - Etapa
Primera - Ate - Lima





Solución Inyectable **VITA STAR AD3E**

Fórmula:

Vitamina A Palmitato 500.000.0 U.I., Vitamina D3
Cristalina 75,000.0 U.I., Vitamina E Acetato 50.0 UI,
Vehículo c.s.p. 1.0 mL.

Indicaciones:

Asociación vitamínica para la profilaxis y
terapéutica de avitaminosis para aumentar el
rendimiento, la fertilidad y la producción, así como
durante el engorde de bovinos, cerdos, caballos,
ovejas, cabras y aves.

Especie destino:

Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos y aves.

Dosis y Vía de administración:

Intramuscular profunda y subcutánea. Potrillos y
Potros 2 mL - 4 mL, Yeguas y Sementales 4 mL - 8
mL, Lechones 0.25 mL - 0,5 mL, Cerdos en engorde
0,5 mL - 1 mL, Cerdos y Verracos 1 mL - 3 mL.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Frasco	20	mL
Frasco	50	mL
Frasco	100	mL
Frasco	250	mL
Frasco	500	mL



Polvo Oral VITASAL

Fórmula: Vitamina A (Palmitato de Retinol) 390.000.0 UI, Vitamina D3 (Colecalciferol) 60,000.0 UI, Vitamina E (Alfa Tocoferol) 120.0 UI, Fósforo (Fosfato Bicalcico) 155.0 g, Calcio (Carbonato de Calcio) 190.00 g, Cloruro de Sodio 64.00 g, Hierro (Sulfato Ferroso) 1.80 g, Magnesio (Sulfato de Magnesio) 1.2 mg, Manganeso (Sulfato de Manganeso) 0.36 g, Cobre (Sulfato de Cobre) 0.12 g, Selenio (Selenio de Sodio) 2.4 mg, Cobalto (Sulfato de Cobalto) 0.79 g, Iodo (Yoduro de Potasio) 18.0 mg, Zinc (Sulfato de Zinc) 480.0 mg, Excipientes c.s.p. 1,000.0 g.

Indicaciones: Esta indicado para mejorar la función de los tejidos, cuando hay una pérdida de peso para mejorar la condición corporal, para mejorar la producción de leche, carne, huevo, lana, mejora la producción, previene muchas enfermedades por deficiencia de minerales y vitaminas.

Especie destino:

Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos.

Dosis y Vía de administración:

Administrar mezclado con el alimento a razón de:
Bovinos: 20 a 50 g por animal. Caprinos, ovinos, camélidos sudamericanos: 15 a 20 g por animal.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Balde	1	kg
Balde	4	kg
Balde	20	kg
Balde	25	kg



Solución Oral **CRECER-SE**

Fórmula:

L-Tirosina 0.8 g, L-Valina 0.5 g, L-Fenilalina 0.5 g, Ácido fólico 2.0 g, Cianocobalamina (B12) 0.001 g, Excipientes c.s.p. 100.0 mL.

Indicaciones:

Indicado para equinos, perros y gatos, su formulación lo hace un suplemento vitamínico con aminoácidos ideal como apoyo en animales con deficiencias nutricionales, corrigiendo carencias nutricionales o para animales de competición con demandas nutricionales mayores. De administración diaria en animales en crecimiento, etapas preparatorias de competición, procesos de recuperación postoperatorio, postcompetición y/o enfermedades que hayan provocado deficiencias nutricionales.

Especie destino:

Equinos, caninos y felinos.

Dosis y Vía de administración:

Administrar vía oral. Administrado directamente o mezclado en el alimento.

Perros: Cachorros y razas miniaturas (1-4 kg) 0.3 - 0.5 mL/animal.

Adultos (5 a 10 kg) 0.7 mL/ animal.

Adultos mayores de 11 kg 1 mL/animal.

Gatos: Cachorros: 0.3 mL/animal y adultos: 0.5 mL/animal.

Caballos: Potros: 1-2 mL/ animal Adultos: 2-3 mL/ animal.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Frasco	100	mL
Frasco	120	mL
Frasco	250	mL
Frasco	500	mL
Frasco	1	Lt



Solución Inyectable

HEPAFORTE B12 +ATP

Fórmula: Cacodilato de Sodio 3.000.0 mg, Citrato de Hierro Amoniacal 2.000.0 mg, Nicotinamida 6.000.0 mg, Riboflavina 5 fosfato 200.0 mg, Clorhidrato de Piridoxina 1.000.0 mg, Vitamina B12 (Cianocobalamina) 1.2 mg, DL Metionina 1.000.0 mg, Triptófano 250.0 mg, Glicerofosfato de Sodio 2.100.0 mg, Histidina 500.0 mg, Adenosin Trifosfato (ATP) 100.0 mg, Cobalto Acetato 50.0 mg, Tiamina 500.0 mg, Ácido Fólico 10.0 mg. Vehículo c.s.p. 100.0 mL.

Indicaciones: HEPAFORTE B12 + ATP es un producto formulado a base de minerales, aminoácidos esenciales, vitaminas de complejo B y ATP (adenosin trifosfato) como fuente de energía de biodisponibilidad inmediata para el tratamiento de la debilidad y enflaquecimiento por alimentación deficiente, agotamiento por trabajo excesivo, inapetencia, convalecencia de enfermedades parasitarias e infecciosas, intoxicaciones, estimulante de la producción de leche, carne, lana y/o fibra, preparación de los animales de deporte y exposición, caída de pelos y otros.

Especie destino:

Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, porcinos caninos y aves.

Dosis y Vía de administración:

Bovinos y equinos: 10-12 mL, Terneros y potrillos: 5-10 mL, Ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: 5 mL, Porcinos: de 2-10 kg. 1 mL; de 10-20 kg. 2 mL; de 20-50 kg. 5 mL; mayores a 50 Kg. 10 mL. Caninos y gallinas: 1 mL por 5 Kg de peso vivo.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Frasco	20	mL
Frasco	50	mL
Frasco	100	mL
Frasco	250	mL
Frasco	500	mL





Solución Inyectable **SUPER GALLO** **5.500**

Fórmula: Cianocobalamina (B12) 2,501.2 mcg, Hidroxycobalamina 3,000.0 mcg, Vitamina B15 (ac. Pangámico) 1,250.0 mcg, Biotina (B7) 50.0 mcg, Vitamina B1 (tiamina) 2.0 mg, Vitamina B2 (Riboflavina) 0.2 mg, Vitamina B3 (Nicotinamida) 4.0 mg, Vitamina B6 (Piridoxina) 0.2 mg, D-Pantenol (B5) 2.0 mg, Excipientes c.s.p. 1.0 mL.

Indicaciones: Reconstituyente nutricional indicado en casos de estrés, sobre esfuerzo, agotamiento y resistencia reducida, como tónico en casos de debilidad, anemia secundaria, indicado como estimulante del apetito para mantener el normal funcionamiento del sistema nervioso. Como coadyudante en el tratamiento de enfermedades infecciosas o parasitarias que produzcan anemia.

Especie destino:

Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, porcinos, caninos, felinos y aves.

Dosis y Vía de administración:

Gallos (aves): 0.01 - 01 mL / día IM o SC, Bovinos, camélidos, equinos, ovinos y caprinos: 0.4 - 0.8 mL / día IM o SC, Porcinos: 0.2 - 0.8 mL / día IM o SC, Caninos: 0.1 - 0.4 mL IM o SC, Felinos: 0.1 - 0.2 mL/SC.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Frasco	10	mL
Frasco	20	mL
Frasco	50	mL
Frasco	100	mL
Frasco	250	mL
Frasco	500	mL





**INDUSTRIAS
FARMACÉUTICAS**
V E T E R I N A R I A S

RECONSTITUYENTE

Solución Inyectable **BUTAVET B12**

Fórmula: Butafosfan 10 g., Vitamina B 12 25.0 mg.,
Excipientes c.s.p. 100.0mL.

Indicaciones: BUTAVET B12, reconstituyente vitamínico-mineral esencial para la salud, crecimiento óptimo y la reproducción de los animales. Está indicado como coadyuvante en enfermedades agudas y trastornos metabólicos agudos como: agotamiento, paresias, inapetencia, disminución del rendimiento lácteo, acetonemia, debilidad vital, enfermedades del recién nacido, lumbago del caballo, auxiliar en la calcioterapia. Enfermedades crónicas y trastornos metabólicos crónicos: trastornos del desarrollo de los animales jóvenes causados por enfermedades del crecimiento, estados de debilidad en perros y gatos. Anemia secundaria o verminosa. Trastornos de la fertilidad. Coadyuvante metabólico: vacas lecheras, al destete de terneros y corderos, mejorar la eficacia reproductiva de los machos, mejorar estado general de los animales.

Especie destino:

Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, porcinos, caninos y felinos.

Dosis y Vía de administración: Bovinos: 0.02 -0.05 mL/Kg de P.V. vía IV. Terneros, potros, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: 0.02 -0.056 mL/Kg de P.V. vía IV. Equinos: 0.02 - 0.05 mL/Kg de P.V. vía IV Porcinos: 0.1 mL/Kg de P.V. por vía IV o IM. Caninos: 0.025 - 0.25 mL/Kg de P.V. vía IV. IM o SC Felinos: 0.1 - 0.5 mL/Kg P.V. vía IV, IM o SC.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Frasco	20	mL
Frasco	50	mL
Frasco	100	mL
Frasco	250	mL
Frasco	500	mL



www.laboratoriosgyt.com



+51- 972 050 995
ventas@laboratoriosgyt.com

Mz. G Lt. 1 Asoc, Hijos
de Apurimac - Etapa
Primera - Ate - Lima





Solución Inyectable VETICAL

Fórmula:

Cada 100 mL contiene: Borogluconato de calcio 26.00 g, Borogluconato de magnesio 6.00 g, Dextrosa 15.00 g, Fósforo elemental 0.50 g, Cafeína 0.50 g, Excipientes c.s.p. 100.0 mL.

Indicaciones:

Indicado para tratamiento de enfermedades en los que se produzca un déficit de calcio, magnesio y fósforo tales como: Gestación, lactación, crecimiento y/o convalecencia. Paresia y parálisis relacionadas con el parto y el puerperio (fiebre vitularia o fiebre de la leche). Tetanias hipocalcémicas/hipomagnesémicas.

Especie destino:

Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, porcinos, caninos y felinos.

Dosis y Vía de administración:

Aplicar vía endovenosa lenta o intramuscular a razón de 0.5 – 1mL/kgpv. De forma práctica se recomienda utilizar de la siguiente manera: Bovinos y equinos (500kg): 250 – 500mL. Ovinos, porcinos, camélidos sudamericanos y caprinos (100kg): 50 – 100mL, Caninos (10 Kg): 5 – 10mL, Felinos (5 kg): 2.5 – 5mL.



**Gratis
Equipo de Venoclisis**

Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Frasco	500	mL





**INDUSTRIAS
FARMACÉUTICAS**
V E T E R I N A R I A S

RECONSTITUYENTE

Solución Inyectable

HIGASAN FORTE

Fórmula:

Nicotinamida 15.0 mg, Pantenol 3.0 mg, Vitamina B6 2.0 mg, Ácido Orótico 5.0 mg, Vitamina B12 3,000.0 µg, Ácido Fólico 0.5 mg, Excipientes c.s.p. 1.0 mL.

Indicaciones:

Está indicado para casos de hepatitis agudas o crónicas causadas por diversas enfermedades infecciosas y/o parasitarias, intoxicaciones medicamentosas o alimenticias. Trastornos de la hematopoyesis. Reconstituyente específico para casos de debilidad y convalecencia, agotamiento y actividades que demanden esfuerzo físico.

Especie destino:

Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, porcinos, caninos, felinos y aves.

Dosis y Vía de Administración:

Intramuscular. Equinos y vacunos: 10 mL., Potros y Terneros: 5 mL, Ovinos, Caprinos, Camélidos sudamericanos y Porcinos: 5 mL, Corderos, Cabritos y Tuis: 2 mL, Lechones: 1 mL, Caninos: 2 - 3, mL, Felinos y aves: 0.1 - mL.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Frasco	20	mL
Frasco	50	mL
Frasco	100	mL
Frasco	250	mL
Frasco	500	mL



www.laboratoriosgyt.com



+51- 972 050 995
ventas@laboratoriosgyt.com

Mz. G Lt. 1 Asoc, Hijos
de Apurimac - Etapa
Primera - Ate - Lima





Solución Inyectable

FERRANIN PLUS B12

Fórmula:

Hierro (como hierro dextrano) 200.0 mg, Cianocobalamina (Vitamina B12) 0.012 mg, Cloruro de Cobalto Acetato 0.5 mg, Triptofano 2.5 mg, Histidina 5.0 mg, Metionina 10.0 mg, Cacodilato de Sodio 30.0 mg, Tiamina Clorhidrato 5.0 mg, Riboflavina 5 Fosfato 2.0 mg, Nicotinamida 50.0 mg, Pirodoxina Clorhidrato 10.0 mg, Glicerofosfato de Sodio 20.0 mg, Vehículo c.s.p. 1.0 mL.

Indicaciones:

Profilaxis y tratamiento de la anemia ferropénica de los lechones coadyuvante en la terapia de las anemias de cualquier origen de los animales domésticos.

Especie destino:

Bovinos, equinos, porcinos y aves.

Dosis y Vía de administración:

Bovinos: Se aplica por vía intramuscular profunda.
Lechones: Tratamiento preventivo 1 mL a los 3-4 días de edad.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Frasco	20	mL
Frasco	50	mL
Frasco	100	mL
Frasco	250	mL
Frasco	500	mL



Mz. G Lt. 1 Asoc, Hijos
de Apurimac - Etapa
Primera - Ate - Lima



+51- 972 050 995
ventas@laboratoriosgyt.com

www.laboratoriosgyt.com




OTRAS CATEGORIAS





Solución Inyectable

KTM

**Fórmula:**

Ketamina Clorhidrato 100.0 mg, Excipientes c.s.p.
1.0 mL.

Indicaciones:

Para la pre-medicación, inducción y mantenimiento de la anestesia. Se puede usar combinado con otras drogas inyectables o inhalatorias, obteniendo un mejor resultado anestésico. En anestesiases generales cortas, para producir una inmovilización del paciente con la finalidad de realizar maniobras quirúrgicas breves o procedimientos diagnósticos menores. En anestesiases de pacientes con riesgo aumentado ya que no compromete el sistema cardiorrespiratorio del animal. De elección en cesáreas, debido a la ausencia de toxicidad fetal.

Especie destino:

Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, porcinos y aves.

Dosis y Vía de administración:

Vía intramuscular, endovenosa, intraperitoneal (ratas, ratones).

**Presentaciones**

Envase	Contiene	Medida
Frasco	20	mL
Frasco	50	mL
Frasco	100	mL



Mz. G Lt. 1 Asoc, Hijos
de Apurimac - Etapa
Primera - Ate - Lima



+51- 972 050 995
ventas@laboratoriosgyt.com

www.laboratoriosgyt.com





**INDUSTRIAS
FARMACÉUTICAS**
V E T E R I N A R I A S

OTRAS
CATEGORÍAS

Solución Inyectable **VETALAM COMPUESTO**

Fórmula: Dipirona 50.0 g, Butilbromuro de hioscina 0.5 g, Excipientes c.s.p. 100.0 mL

Indicaciones: Indicado para el tratamiento y la prevención de todos aquellos procesos agudos y crónicos que cursen con inflamación, dolor, fiebre, espasmos, cólicos, procesos osteoarticulares y musculoesqueléticos como artritis, artrosis, osteoartritis, etc., enfermedad articular degenerativa, síndrome ciático.

Especie destino: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, porcino y caninos.

Dosis y Vía de administración: Equinos: 20 mg de dipirona y 0.2 mg de N-butilbromuro de hioscina/kg de pc (es decir 2 ml por 50kg), vía IV. Bovino: 30 mg de dipirona y 0.3 mg de N-butilbromuro de hioscina/kg de pc (es decir, 3 ml por 50 kg), vía IV o IM. Ternero: 40 mg de dipirona y 0.4 mg de N-butilbromuro de hioscina/kg de pc (es decir 0.8 ml por 10kg), vía IM. Ovinos, caprinos, camélidos: 25 mg de dipirona y 0.25 mg de N-butilbromuro de hioscina/kg de pv (es decir, 0.5 ml por 10 kg), vía IV o IM. Porcino: 40 mg de dipirona y 0.4 mg de N-butilbromuro de hioscina/kg de pc (es decir, 0.8 ml por 10 kg), vía IM. Canino: 30 mg de dipirona/kg de peso corporal y 0.3 mg de N-butilbromuro de hioscina/kg de pc (es decir, 0.06 ml por kg), vía IV o IM. (pc = peso corporal; IV = intravenosa; IM = intramuscular).



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Frasco	20	mL
Frasco	50	mL
Frasco	100	mL
Frasco	250	mL
Frasco	500	mL



www.laboratoriosgyt.com



+51- 972 050 995
ventas@laboratoriosgyt.com

Mz. G Lt. 1 Asoc, Hijos
de Apurimac - Etapa
Primera - Ate - Lima





Solución concentrada

KRESO G&T

Fórmula:

Creosota 36.0 mL, Excipientes c.s.p. 100.0 mL.

Indicaciones:

Solución concentrada desinfectante y antibacteriana de uso veterinario a base de cresoles. Para ser utilizada en pisos, paredes y techos de explotaciones pecuarias como establos, galpones, porquerizas, pediluvios, etc., por su capacidad de neutralizar los gérmenes que causan el mal olor.

Especie destino:

Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos y aves.

Dosis y Vía de Administración:

Uso externo. Se recomienda diluir 0.5 L del producto KRESO G&T en 20 L de agua.

Eliminar el envase y los residuos en los drenajes pluviales, para evitar la contaminación. No reutilice los envases vacíos. Muy tóxico para animales acuáticos.

**Presentaciones**

Envase	Contiene	Medida
Frasco	120	mL
Frasco	250	mL
Frasco	500	mL
Frasco	1	Lt
Frasco	4	Lt



Mz. G Lt. 1 Asoc, Hijos
de Apurimac - Etapa
Primera - Ate - Lima



+51- 972 050 995
ventas@laboratoriosgyt.com

www.laboratoriosgyt.com





**INDUSTRIAS
FARMACÉUTICAS**
V E T E R I N A R I A S

OTRAS
CATEGORIAS

Solución concentrada **YODEX 15%**

Fórmula:

Yodo sublimado 15.0g, Yoduro de potasio 15.4g,
Excipientes c.s.p. 100.0mL.

Indicaciones:

Tintura de yodo con acción antiséptica y desinfectante. Se puede utilizar para: La desinfección de la piel sana, el tratamiento de afecciones de la pie causadas por bacterias y hongos, la limpieza de las heridas, la preparación de la piel antes de la cirugía y la preparación de la piel previa a punciones.

Especie destino:

Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos.

Dosis y Vía de Administración:

Uso tópico, aplicar el producto a modo de toques, en cantidad suficiente para cubrir el área a tratar. Repetir las veces que sea necesario o según el programa de limpieza y desinfección.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Frasco	120	mL
Frasco	250	mL
Frasco	500	mL
Frasco	1	Lt
Frasco	4	Lt



www.laboratoriosgyt.com



+51- 972 050 995
ventas@laboratoriosgyt.com

Mz. G Lt. 1 Asoc, Hijos
de Apurimac - Etapa
Primera - Ate - Lima





Suspensión Inyectable **VERRUFORTE + REGEVIT**

Fórmula:

Clorobutanol 250.0 mg, Vitamina A 6,250.0 UI,
Vitamina E 5.0 UI, Excipientes 1.0 mL.

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de las verrugas o papilomatosis en bovinos, porcinos, camélidos sudamericanos, ovinos, caprinos, caninos y felinos

Especie destino:

Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, caninos y felinos.

Dosis y Vía de Administración:

Porcinos, camélidos sudamericanos, ovinos, caprinos, felinos: 1 mL/20 Kg de peso vivo. Bovinos y caninos: 1 mL-4 mL/20 Kg.



Presentaciones

Envase	Contiene	Medida
Frasco	20	mL
Frasco	50	mL
Frasco	100	mL
Frasco	250	mL





INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS V E T E R I N A R I A S



Contáctenos ahora
972 050 995

Mz. G Lt. 1 Asoc. Hijos
de Apurímac - Etapa
Primera - Ate - Lima



www.laboratoriosgyt.com



@laboratoriosgyt